CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em dezembro o monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados registrou 11 espécies entre as áreas produtivas e de conservação da empresa. A riqueza identificada nesse período compreende cinco famílias das ordens Anura e Squamata.

Entre os registros obtidos em dezembro, a cobra-espada [*Tomodon dorsatus*] constitui uma nova espécie identificada no monitoramento, que ao todo já registrou 24 espécies da herpetofauna para as áreas da empresa em 2019.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna pela circular e conheça a espécie que se destacou neste mês.

DESTAQUE

Cobra-espada

(Tomodon dorsatus)

A cobra-espada é uma serpente de ampla distribuição geográfica ocorrendo no centro-sul da América do Sul, nos seguintes países: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Presentes em matas úmidas, é mais facilmente registrada em áreas de mata ciliar.

A cobra-espada não é uma serpente peçonhenta, portanto, não oferece quaisquer riscos para saúde pública ou acidentes ofídicos.

Quando ameaçada apresenta um rico repertório defensivo, podendo achatar o corpo, triangular a cabeça, desferir botes, escancara a boca e expor a mucosa oral escura, adquirir forma de bola e realizar tanatose [Fingir-se de morta].

Devido ao padrão de desenhos de suas escamas e comportamentos defensivos é comumente confundida por leigos com a serpente peçonhenta jararaca [*Bothrops jararca*].

Nas áreas da Florestal Gateados a espécie foi registrada em área de mata ciliar, em período noturno, durante amostragem de anuro fauna em sítio de reprodução.

RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – dezembro/2019

TOTAL: 11		ESPÉCIES REGISTRADAS DEZEMBRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Bufonidae	*Rhinella icterica*	Sapo-cururu
	Hylidae	*Boana bischoffi*	Perereca
		Dendropsophus minutus	Pererequinha-do-brejo
		Scinax fuscovarius	Perereca-de-banheiro
		Scinax perereca	Perereca-de-banheiro
		Sphaenorhynchus surdus	Pererequinha-verde
	Leptodactylidae	*Leptodactylus gracilis*	Rã-listrada
		Leptodactylus latrans	Rã-manteiga
		Physalaemus cuvieri	Rã-cachorro
	Odontophrynidae	*Odontophrynus americanus*	Sapo-da-enchente
Squamata	Colubridae	*Tomodon dorsatus*	Cobra-espada

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – dezembro/2019

Área Nativa	Área de Plantio
Rhinella icterica	*Rhinella icterica*
Boana bischoffi	*Physalaemus cuvieri*
Dendropsophus minutus	*Leptodactylus gracilis*
Scinax fuscovarius	*Scinax fuscovarius*
Scinax perereca	*Scinax perereca*
Sphaenorhynchus surdus	
Leptodactylus gracilis	
Leptodactylus latrans	
Physalaemus cuvieri	
Odontophrynus americanus	
Tomodon dorsatus	
Total de espécies na mata nativa: 11	Total de espécies no plantio florestal: 5

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até dezembro/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 24

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA AQUI

FOTOS DO MÊS

Rã-manteiga
(*Leptodactylus latrans*)

Rã-cachorro
(*Physalaemus cuvieri*)

Perereca
(*Boana bischoffi*)