

Circular Mensal

Em fevereiro, o monitoramento da avifauna nas áreas da Florestal Gateados identificou a presença de 226 aves de 37 espécies pertencentes a 21 famílias e 10 ordens. Nos ambientes de mata nativa, 32 espécies foram encontradas, já no plantio florestal houve o registro de 14 espécies de aves.

O monitoramento é sistematizado e encontra-se na segunda campanha de 2018. Neste ano já foram identificadas 61 espécies de aves utilizando as áreas da Florestal Gateados.

Acompanhe a evolução deste estudo e conheça as espécies da avifauna que são destaques de cada mês.

AVE DESTAQUE

Pichororé

(*Synallaxis ruficapilla*)

O pichororé é uma espécie relativamente comum de matas úmidas. Vive principalmente em bordas de matas primárias em altitude de até 1.400m. Nesses locais, procura por artrópodes em arbustos e brechas densas próximas ao solo. É facilmente reconhecido no ambiente pelo seu canto, pois vocaliza na maior parte do tempo enquanto realiza a busca por alimentos. O seu ninho é formado por um aglomerado de gravetos, e na maioria das vezes observa-se a presença de mudas de peles de lagartos e serpentes, como um método suposto que este pássaro utiliza para espantar os próprios predadores. Não é uma espécie ameaçada de extinção, e nas áreas da Florestal Gateados encontra abrigo e alimento em abundância, conseguindo desenvolver assim o seu papel ecológico.



ESCUTE 

Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Fevereiro /2018

Área Nativa	Área de Plantio
Arapaçu-de-garganta-branca (<i>Xiphocolaptes albicollis</i>)	Andorinha-pequena-de-casa (<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>)
Arapaçu-rajado (<i>Xiphorhynchus fuscus</i>)	Bem-te-vi-rajado (<i>Myiodynastes maculatus</i>)
Arapaçu-verde (<i>Sittasomus griseicapillus</i>)	Bico-chato-de-orelha-preta (<i>Tolmomyias sulphureus</i>)
Bem-te-vi (<i>Pitangus sulphuratus</i>)	Canário-da-terra-verdadeiro (<i>Sicalis flaveola</i>)
Bem-te-vi-rajado (<i>Myiodynastes maculatus</i>)	Choca-da-mata (<i>Thamnophilus caerulescens</i>)
Borboletinha-do-mato (<i>Phylloscartes ventralis</i>)	Coleirinho (<i>Sporophila caerulescens</i>)
Cais-cais (<i>Euphonia chalybea</i>)	Gralha-picaça (<i>Cyanocorax chrysops</i>)
Caneleiro-preto (<i>Pachyrhamphus polychropterus</i>)	Irré (<i>Myiarchus swainsoni</i>)
Choca-da-mata (<i>Thamnophilus caerulescens</i>)	Neinei (<i>Megarynchus pitangua</i>)
Estalador (<i>Corythopsis delalandi</i>)	Pitiguari (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)
Gavião-bombachinha (<i>Harpagus diodon</i>)	Pula-pula-assobiador (<i>Myiothlypis leucoblephara</i>)
Gralha-picaça (<i>Cyanocorax chrysops</i>)	Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)
Grimpeiro (<i>Leptasthenura setaria</i>)	Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i>)
Guaracava-de-bico-curto (<i>Elaenia parvirostris</i>)	Tucano-de-bico-verde (<i>Ramphastos dicolorus</i>)
Inhambuguaçu (<i>Crypturellus obsoletus</i>)	
Irré (<i>Myiarchus swainsoni</i>)	
João-bobo (<i>Nystalus chacuru</i>)	
Juriti-pupu (<i>Leptotila verreauxi</i>)	
Juruviara (<i>Vireo chivi</i>)	
Mariquita (<i>Setophaga pitayumi</i>)	
Pichororé (<i>Synallaxis ruficapilla</i>)	
Pitiguari (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)	
Pombão (<i>Patagioenas picazuro</i>)	
Pula-pula (<i>Basileuterus culicivorus</i>)	
Pula-pula-assobiador (<i>Myiothlypis leucoblephara</i>)	
Saracura-do-mato (<i>Aramides saracura</i>)	
Seriema (<i>Cariama cristata</i>)	
Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)	
Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis</i>)	
Trepadorzinho (<i>Heliobletus contaminatus</i>)	
Tucano-de-bico-verde (<i>Ramphastos dicolorus</i>)	
Tucão (<i>Elaenia obscura</i>)	
Total de espécies registradas em fevereiro: 37	Total de espécies registradas nas áreas: 61

Fotos do Mês

Gavião-bombachinha
Harpagus diodon



Coleirinha
Sporophila caerulescens



Arapaçu-de-garganta-branca
Xiphocolaptes albicollis

