

## CIRCULAR MENSAL

### MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados realizado no mês de maio de 2020 teve como resultado quatro espécies identificadas. A baixa densidade de espécies nas áreas é decorrente da estiagem que se encontra no estado, juntamente com as baixas temperaturas da atual estação.

Não houve novas espécies registradas nesta campanha, mantendo assim até o presente momento a riqueza de 27 espécies para as áreas da empresa.

A seguir descubra um pouco mais sobre a espécie que se destacou neste mês, a lista de espécies registradas, os ambientes em que foram encontradas e os registros fotográficos da incursão.

### DESTAQUE

#### Perereca-de-banheiro (*Scinax fuscovarius*)

Como características, esta espécie apresenta pele com granulações e coloração castanho-escuro a castanho-acinzentado no dorso. O ventre é esbranquiçado, ambos com manchas escuras. Apresentam tímpano com maior diâmetro que os discos adesivos dos dedos.

Para o Brasil a espécie é amplamente distribuída nas regiões Sul e Sudeste, habitando áreas abertas como pastagens e campos úmidos. Também ocorre em áreas alteradas, visto que este anfíbio é tolerante a perturbações ambientais. Durante o dia geralmente pode ser encontrado em tocas no solo, árvores e em construções humanas.

A reprodução do *S. fuscovarius* ocorre em lagos ou campos inundados, em períodos de alto ou médio volume de chuva. Os machos vocalizam após o pôr do sol, entre arbustos próximo às margens das áreas alagadas, ou na vegetação de lagos. A deposição dos ovos é feita na vegetação aquática após amplexo.

Nesta campanha esta espécie foi identificada por meio de vocalização, às margens de um sítio de reprodução.



ESCUTE 

## RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – maio/2020

| TOTAL: 4 |                 | ESPÉCIES REGISTRADAS MAIO       |                      |
|----------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Ordem    | Família         | Nome científico                 | Nome Popular         |
| Anura    | Hylidae         | <i>Boana bischoffi</i>          | Perereca             |
|          |                 | <i>Scinax fuscovarius</i>       | Perereca-de-banheiro |
|          | Odontophrynidae | <i>Odontophrynus americanus</i> | Sapo-da-enchente     |
| Squamata | Teiidae         | <i>Salvator merianae</i>        | Teiú                 |

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – maio/2020

| Área Nativa                         | Área de Plantio                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                     | <i>Boana bischoffi</i>                    |
|                                     | <i>Scinax fuscovarius</i>                 |
|                                     | <i>Odontophrynus americanus</i>           |
|                                     | <i>Salvator merianae</i>                  |
| Total de espécies na mata nativa: 0 | Total de espécies no plantio florestal: 4 |

\*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até maio/2020.


| TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27 |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>ACESSE O MAPA <a href="#">AQUI</a></b> |
|-------------------------------------------|

## FOTOS DO MÊS

**Rã-da-enchente**  
[*Odontophrynus americanus*]



**Área de sítio de  
reprodução**  
[Em período de estiagem]



**Vestígio de Teiú**  
[*Salvator merianae*]

