

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados do mês de novembro de 2020 obteve uma riqueza de 8 espécies, divididas em 4 famílias e duas ordens: Anura [anfíbios] e Squamata [serpentes, lagartos e anfisbenas].

Nesta incursão, uma espécie rara e inéditas para o monitoramento foi registrada: a Perereca-leiteira [*Trachycephalus dibernardoi*]. Com essa nova espécie, o monitoramento já registrou o total de 31 táxons da herpetofauna nas áreas da empresa.

Isso é um ótimo indício de que as populações abrigadas pela Florestal Gateados estão se mantendo, ou até mesmo aumentando, ao longo do tempo; reafirmando a eficiência e importância do manejo florestal sustentável conduzido.

Confira a seguir mais informações sobre as espécies registradas neste monitoramento e saiba mais sobre a Perereca-leiteira.

DESTAQUE

Perereca-leiteira

(*Trachycephalus dibernardoi*)

A Perereca-leiteira [*Trachycephalus dibernardoi*] é uma espécie rara, de tamanho relativamente grande, com os machos medindo 5 a 6,5cm e as fêmeas 7 a 8,5cm. Seu dorso é uma mistura de tons de verde, amarelo e marrom preenchido por manchas em forma de ocelos, enquanto seus membros possuem largas barras transversais.

Apesar do tamanho e da coloração, é uma espécie muito rara de ser registrada, pois os machos vocalizam apenas esporadicamente, somente em algumas noites da época de reprodução e com condições bastante específicas: em noites sem chuva, mas após chuva forte durante o dia.

Possui inúmeras glândulas visíveis em sua pele. Essas glândulas são responsáveis pela produção de um veneno branco e pegajoso, o qual libera quando o anuro é perturbado.

É um anfíbio endêmico da Mata Atlântica, com pouquíssimos registros científicos de sua ocorrência.

O indivíduo da foto ao lado foi registrado na área de vegetação nativa da fazenda Matriz da Florestal Gateados.



ESCUTE



RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – novembro/2020

TOTAL: 8		ESPÉCIES REGISTRADAS NOVEMBRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
	Hylidae	<i>Boana bischoffi</i>	Perereca
		<i>Boana leptolineata</i>	Perereca-de-pijama
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Scinax Perereca</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Trachycephalus dibernardoi</i>	Perereca-leiteira
Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Teiú

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – novembro/2020

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Rhinella icterica</i>	
<i>Boana bischoffi</i>	
<i>Boana leptolineata</i>	
<i>Dendropsophus minutus</i>	
<i>Scinax fuscovarius</i>	
<i>Scinax perereca</i>	
<i>Trachycephalus dibernardoi</i>	
<i>Salvator merianae</i>	
Total de espécies na mata nativa: 8	Total de espécies no plantio florestal: 0

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até novembro/2020.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 31

FOTOS DO MÊS

Teiú
[*Salvator merianae*]



Pererequinha-do-brejo
[*Dendropsophus minutus*]



Perereca-do-banheiro
[*Scinax perereca*]

