

## Circular Mensal

No mês de junho o monitoramento da avifauna da Florestal Gateados registrou a presença de 39 espécies pertencentes a 21 famílias e seis ordens. Entre os diferentes ambientes monitorados identificou-se a presença de 32 espécies em áreas de mata nativa e 11 espécies em área de plantio florestal.

O monitoramento é sistematizado e encontra-se na sexta campanha de 2018. Neste ano já foram identificadas 97 espécies de aves que utilizam as áreas da Florestal Gateados como abrigo.

Acompanhe a evolução deste estudo e conheça as espécies da avifauna que são destaques de cada mês.

### AVE DESTAQUE

#### **Gralha-picaça** (*Cyanocorax chrysops*)

A gralha-picaça habita as matas de araucária em bandos, alimenta-se de insetos, frutos e até mesmo ovos de outras aves. Apreciam muitíssimo o pinhão, e assim como a gralha-azul, acabam enterrando alguns pinhões no solo, entre a serapilheira, para consumir posteriormente. Os pesquisadores a consideram a mais elegante das espécies de gralhas que ocorrem na mata atlântica. No Brasil apresenta uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo em Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas áreas da Florestal Gateados esta espécie pode ser encontrada durante todo o ano, desempenhando um importante papel na manutenção das florestas nativas, sendo assim, é considerada um reflexo da qualidade ambiental local.



ESCUTE 

# Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Junho /2018

| Área Nativa                                                   | Área de Plantio                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arapaçu-escamado-do-sul ( <i>Lepidocolaptes falcinellus</i> ) | Arapaçu-verde ( <i>Sittasomus griseicapillus</i> )      |
| Arapaçu-rajado ( <i>Xiphorhynchus fuscus</i> )                | Canário-da-terra-verdadeiro ( <i>Sicalis flaveola</i> ) |
| Arapaçu-verde ( <i>Sittasomus griseicapillus</i> )            | Carcará ( <i>Caracara plancus</i> )                     |
| Borboletinha-do-mato ( <i>Phylloscartes ventralis</i> )       | Corruíra ( <i>Troglodytes musculus</i> )                |
| Choca-da-mata ( <i>Thamnophilus caerulescens</i> )            | Gavião-asa-de-telha ( <i>Parabuteo unicinctus</i> )     |
| Coleirinho ( <i>Sporophila caerulescens</i> )                 | Gavião-carijó ( <i>Rupornis magnirostris</i> )          |
| Cuiú-cuiú ( <i>Pionopsitta pileata</i> )                      | Grimpeiro ( <i>Leptasthenura setaria</i> )              |
| Gralha-azul ( <i>Cyanocorax caeruleus</i> )                   | Pichororé ( <i>Synallaxis ruficapilla</i> )             |
| Gralha-picaça ( <i>Cyanocorax chrysops</i> )                  | Pintassilgo ( <i>Spinus magellanicus</i> )              |
| Inhambuguaçu ( <i>Crypturellus obsoletus</i> )                | Pombão ( <i>Patagioenas picazuro</i> )                  |
| João-teneném ( <i>Synallaxis spixi</i> )                      | Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )               |
| Juriti-gemedeira ( <i>Leptotila rufaxilla</i> )               |                                                         |
| Limpa-folha-miúdo ( <i>Anabacerthia amaurotis</i> )           |                                                         |
| Maitaca-verde ( <i>Pionus maximiliani</i> )                   |                                                         |
| Peito-pinhão ( <i>Poospiza thoracica</i> )                    |                                                         |
| Pi-puí ( <i>Synallaxis cinerascens</i> )                      |                                                         |
| Pintassilgo ( <i>Spinus magellanicus</i> )                    |                                                         |
| Pitiguari ( <i>Cyclarhis gujanensis</i> )                     |                                                         |
| Pombão ( <i>Patagioenas picazuro</i> )                        |                                                         |
| Pula-pula-assobiador ( <i>Myiothlypis leucoblephara</i> )     |                                                         |
| Sabiá-laranjeira ( <i>Turdus rufiventris</i> )                |                                                         |
| Sabiá-poca ( <i>Turdus amaurochalinus</i> )                   |                                                         |
| Saíra-preciosa ( <i>Tangara preciosa</i> )                    |                                                         |
| Tapaculo-preto ( <i>Scytalopus speluncae</i> )                |                                                         |
| Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )                     |                                                         |
| Tico-tico-da-taquara ( <i>Microspingus cabanisi</i> )         |                                                         |
| Tiriba-de-testa-vermelha ( <i>Pyrrhura frontalis</i> )        |                                                         |
| Tororó ( <i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> )                  |                                                         |
| Tovaca-campainha ( <i>Chamaeza campanisona</i> )              |                                                         |
| Trepadorzinho ( <i>Heliobletus contaminatus</i> )             |                                                         |
| Trinca-ferro ( <i>Saltator similis</i> )                      |                                                         |
| Verdinho-coroado ( <i>Hylophilus poicilotis</i> )             |                                                         |
| <b>Total de espécies registradas em junho: 39</b>             | <b>Total de espécies registradas nas áreas: 97</b>      |

## Fotos do Mês

**Pintassilgo**  
*Spinus magellanicus*



**Gralha-azul**  
*Cyanocorax caeruleus*



**Grimpeiro**  
*Leptasthenura setaria*

